



**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Caja con frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 60 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** El frasco con polvo contiene:  
 Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 3.000 g  
 de Amoxicilina.

Excipiente cbp..... 1 Frasco.



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.  
Reporte las sospechas de reacción  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C. *y en lugar seco.*  
Consérvese la caja bien cerrada.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de  
30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.  
Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta  
mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y  
agítese.

Lote.  
Caducidad.  
Precio máximo al público.  
**Reg. No. 534M99 SSA IV**  
Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**  
Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**




**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 60 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 5.000 g  
de Amoxicilina.  
Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C y en lugar seco,

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA SIN CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 60 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 5.000 g  
de Amoxicilina.  
Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*  
Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.  
ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.  
Caducidad.  
Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**  
Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**  
Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Caja con frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 75 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** El frasco con polvo contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 3.750 g  
de Amoxicilina.

Excipiente cbp..... 1 Frasco.



**DOSIS:** La que el médico señale.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *x y en lugar seco.*

Consérvese la caja bien cerrada.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 75 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 5.000 g  
de Amoxicilina.  
Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA SIN CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN  
AMOXICILINA  
SUSPENSIÓN  
250 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 75 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:

Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... de Amoxicilina.	5.000 g
Vehículo cbp.....	100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C y en lugar seco  
Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.  
ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.


**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.  
Caducidad.  
Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**  
Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**




**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Caja con frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 90 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** El frasco con polvo contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 4.500 g  
de Amoxicilina.  
Excipiente cbp..... 1 Frasco.



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.  
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*  
Consérvese la caja bien cerrada.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.  
Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

**ANTIBIOTICO.** El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.  
**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.  
Caducidad.  
Precio máximo al público.  
**Reg. No. 534M99 SSA IV**  
Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**  
Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 90 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 5.000 g  
de Amoxicilina.  
Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.  
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*  
Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.  
ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.  
Caducidad.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**  
Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**





**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA SIN CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 90 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 5.000 g  
de Amoxicilina.

Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C<sub>x</sub> y en lugar seco.

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**

Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Caja con frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 100 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** El frasco con polvo contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 5.000 g  
de Amoxicilina.

Excipiente cbp..... 1 Frasco.



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*

Consérvese la caja bien cerrada.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 100 mL una vez hecha la mezcla.

<b>Fórmula:</b>	Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:	
	Amoxicilina Trihidratada equivalente a.....	5.000 g
	de Amoxicilina.	
	Vehículo cbp.....	100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *x y en lugar seco.*

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA SIN CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**250 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 100 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 5.000 g  
de Amoxicilina.  
Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 250 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C, *y en lugar seco.*

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 43.47 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**

Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Caja con frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 60 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** El frasco con polvo contiene:

Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 6.000 g  
de Amoxicilina.  
Excipiente cbp..... 1 Frasco.



**DOSIS:** La que el médico señale.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *en lugar seco.*

Consérvese la caja bien cerrada.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**

Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**




**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 60 mL una vez hecha la mezcla.

<b>Fórmula:</b>	Hecha la mezcla cada 100 mL contiene	
	Amoxicilina Trihidratada equivalente a.....	10.000 g
	de Amoxicilina.	
	Vehículo cbp.....	100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *x y en lugar seco.*

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**

Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**


Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION  
CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
COMISION DE AUTORIZACION  
SANITARIA



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA SIN CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 60 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 10.000 g  
de Amoxicilina.

Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Caja con frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 75 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** El frasco con polvo contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 7.500 g  
de Amoxicilina.

Excipiente cbp..... 1 Frasco.



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*  
Consérvese la caja bien cerrada.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.  
ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**





**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 75 mL una vez hecha la mezcla.

<b>Fórmula:</b>	Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:	
	Amoxicilina Trihidratada equivalente a.....	10.000 g
	de Amoxicilina.	
	Vehículo cbp.....	100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C y en lugar seco.

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA SIN CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 75 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:

Amoxicilina Trihidratada equivalente a.....	10.000 g
de Amoxicilina.	
Vehículo cbp.....	100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.  
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C y en lugar seco.  
Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.  
ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.


**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.  
Caducidad.  
Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**  
Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Caja con frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 90 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** El frasco con polvo contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 9.000 g  
de Amoxicilina.  
Excipiente cbp..... 1 Frasco.



**DOSIS:** La que el médico señale.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*

Consérvese la caja bien cerrada.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**

Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 90 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:

Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 10.000 g  
de Amoxicilina.

Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**


Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atlacomulco, C.P. 50458,

Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA SIN CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 90 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:  
Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 10.000 g  
de Amoxicilina.  
Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*  
Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.  
ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.


**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.  
Caducidad.  
Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**  
Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Caja con frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 100 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** El frasco con polvo contiene:

Amoxicilina Trihidratada equivalente a.....	10.000 g
de Amoxicilina.	
Excipiente cbp.....	1 Frasco.



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.  
Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*  
Consérvese la caja bien cerrada.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.  
ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.  
Caducidad.  
Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**

Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**  
Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA**

Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 100 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:

Amoxicilina Trihidratada equivalente a..... 10.000 g  
de Amoxicilina.

Vehículo cbp..... 100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.  
Su venta requiere receta médica.  
No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.  
Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*  
Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.  
ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.



**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.  
**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.  
Caducidad.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**  
Hecho en México por:  
**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043  
Atlacomulco, C.P. 50458,  
Atlacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA SIN CAJA**


Venta al público.

**DIMOPEN**  
**Amoxicilina**  
**SUSPENSIÓN**  
**500 mg / 5 mL**

Frasco con polvo y vaso dosificador,  
para 100 mL una vez hecha la mezcla.

**Fórmula:** Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:

Amoxicilina Trihidratada equivalente a.....	10.000 g
de Amoxicilina.	
Vehículo cbp.....	100 mL



**DOSIS:** La que el médico señale.  
**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

Léase instructivo.

Agítese antes de usarse.

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cada 5 mL equivalen a 500 mg de Amoxicilina.

Consérvese o manténgase a no más de 30 °C *y en lugar seco.*

Consérvese el frasco bien cerrado.

Hecha la mezcla el producto se conserva 7 días a temperatura ambiente a no más de 30 °C ó 14 días en refrigeración de 2 °C a 8 °C. No se congele.

Este medicamento contiene 48.46 por ciento de azúcar.

ANTIBIOTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

Lote.

Caducidad.

Precio máximo al público.

**Reg. No. 534M99 SSA IV**



Hecho en México por:

**BRULUAGSA, S.A. de C.V.**

Ingeniero Salvador Sánchez Colín No. 10043,

Atacomulco, C.P. 50458,

Atacomulco, México.



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**





**PROYECTO DE MARBETE PARA EL INSTRUCTIVO**  
**IMPRESO EN LA ETIQUETA**

**INSTRUCTIVO:**


Léase instructivo impreso.

1. Cualquier tipo de penicilina administrada por cualquier vía ofrece el peligro de desencadenar reacciones alérgicas.
2. Estas reacciones pueden presentarse tanto en personas que ya han recibido una medicación previa de cualquier tipo de penicilina y por cualquier vía, así como en los pacientes que nunca han recibido esta clase de medicamento.
3. La sensibilidad de cada persona al medicamento es variable. Cuando las reacciones alérgicas se presentan, pueden consistir en: urticaria, prurito (comezón), asma, inflamación de las manos, labios, párpados y articulaciones; fiebre y estado de choque anafiláctico, pudiendo producir reacciones de diversa magnitud que van desde las leves hasta las graves.
4. La penicilina es un medicamento útil, que solamente el médico, basándose en las reacciones anteriores producidas en el enfermo, ya sea por el uso del medicamento o por cualquier otro factor alérgico (inclusive de origen alimenticio), puede determinar si este producto debe o no ser administrado.
5. Este medicamento contiene penicilina, y por lo tanto, no deberá administrarse en ningún caso si no es precisamente por prescripción y bajo vigilancia médica.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

**UNI VERIX**  
QFB. Erick Iván Bermúdez Ayala  
Dictaminador Químico de Medicamentos  
Fecha 12 SEP 2014 Firma

**UNI VERIX**  
Dr. Omar Francisco Carrasco Ortega  
Dictaminador Médico de Medicamentos  
Fecha 12 SEP 2014 Firma



**Bruluagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA EL INSTRUCTIVO**  
**IMPRESO EN LA ETIQUETA**

**INSTRUCTIVO:**

Léase instructivo impreso.



**INDICACIONES HIGIÉNICO DIETÉTICAS.**

Este medicamento se puede consumir con o sin alimentos. Siga cuidadosamente las instrucciones y consulte con su médico cualquier duda, no exceda la dosificación.

**INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN.**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

**PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES.**

Este medicamento contiene penicilina, y por lo tanto, no deberá administrarse en ningún caso si no es precisamente por prescripción y bajo vigilancia médica.

Cualquier tipo de penicilina administrada por cualquier vía ofrece el peligro de desencadenar reacciones alérgicas.

Estas reacciones pueden presentarse tanto en personas que ya han recibido una medicación previa de cualquier tipo de penicilina y por cualquier vía, así como en los pacientes que nunca han recibido esta clase de medicamento.

La penicilina es un medicamento útil, que solamente el médico, basándose en las reacciones anteriores producidas en el enfermo, ya sea por el uso del medicamento o por cualquier otro factor alergénico (inclusive de origen alimenticio), puede determinar si este producto debe o no ser administrado.

**REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES Y REACCIONES ADVERSAS GRAVES.**

La sensibilidad de cada persona al medicamento es variable. Cuando las reacciones alérgicas se presentan, pueden consistir en: urticaria, prurito (comezón), asma, inflamación de las manos, labios, párpados y articulaciones; fiebre y estado de choque anafiláctico, pudiendo producir reacciones de diversa magnitud que van desde las leves hasta las graves.

**INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y BEBIDAS.**

A menos que su médico le indique de otro modo, siga con su régimen de alimentación normal.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.**

En caso de que este consumiendo cimetidina, probenecid, cloranfenicol u otros antibióticos, mencione a su médico para cambiar la dosis de su medicamento o vigilarle para evitar el desarrollo de complicaciones relacionadas con efectos secundarios.

“Si tiene alguna duda, consulte a su médico”.

**Bruhuagsa, S.A. de C.V.**



**PROYECTO DE MARBETE PARA EL INSTRUCTIVO**  
**IMPRESO EN LA CAJA**

**INSTRUCTIVO:**



Léase instructivo impreso.

**INDICACIONES HIGIÉNICO DIETÉTICAS.**

Este medicamento se puede consumir con o sin alimentos. Siga cuidadosamente las instrucciones y consulte con su médico cualquier duda, no exceda la dosificación.

**INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN.**

Aflójese el polvo golpeando suavemente el frasco por los lados.

**Diluyente recomendado:** Agréguese agua purificada y fría, agítese fuertemente hasta mezclar, deje reposar por un minuto y agregué agua nuevamente hasta la marca y agítese.

**PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES.**

Este medicamento contiene penicilina, y por lo tanto, no deberá administrarse en ningún caso si no es precisamente por prescripción y bajo vigilancia médica.

Cualquier tipo de penicilina administrada por cualquier vía ofrece el peligro de desencadenar reacciones alérgicas.

Estas reacciones pueden presentarse tanto en personas que ya han recibido una medicación previa de cualquier tipo de penicilina y por cualquier vía, así como en los pacientes que nunca han recibido esta clase de medicamento.

La penicilina es un medicamento útil, que solamente el médico, basándose en las reacciones anteriores producidas en el enfermo, ya sea por el uso del medicamento o por cualquier otro factor alérgico (inclusive de origen alimenticio), puede determinar si este producto debe o no ser administrado.

**REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES Y REACCIONES ADVERSAS GRAVES.**

La sensibilidad de cada persona al medicamento es variable. Cuando las reacciones alérgicas se presentan, pueden consistir en: urticaria, prurito (comezón), asma, inflamación de las manos, labios, párpados y articulaciones; fiebre y estado de choque anafiláctico, pudiendo producir reacciones de diversa magnitud que van desde las leves hasta las graves.

**INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y BEBIDAS.**

A menos que su médico le indique de otro modo, siga con su régimen de alimentación normal.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.**

En caso de que este consumiendo cimetidina, probenecid, cloranfenicol u otros antibióticos, mencione a su médico para cambiar la dosis de su medicamento o vigilarle para evitar el desarrollo de complicaciones relacionadas con efectos secundarios.

“Si tiene alguna duda, consulte a su médico”.

**Bruluagsa, S.A. de C.V.**

